

NOUVEAUX COLÉOPTÈRES (1^{re} NOTE).

PAR M. M. PIC.

Mimoxenotermes n. gen.

Capite antice et supra oculos valde elevato et medio inciso, oculis approximalis; antennis 10 articulatis, articulis 2^o et sequentibus particularibus, apice plus minusve transverse prolongatis, articulo ultimo simplice, elongato, apice subtruncato; thorace nulli et diverse plicato, angulis anticis paulo prominulis, elytris nulli et longe costalis, costis apice pro parte tuberculato-dentulis; pedibus elongatis. Groupe des Ryssopaussidæ.

Ce genre voisin de *Xenotermes* Wasm., s'en distingue par la structure des antennes dont les articles 2 et suivants sont en forme d'hélice avec les extrémités transverses en forme de bouton et les côtes 2, 4, 5 saillantes en dent émoussée près de l'apex des élytres. Il est établi pour l'espèce suivante communiquée par notre collègue E. Fleutiaux.

Mimoxenotermes Duporti n. sp.

Elongatus, nitidus, rufus; capite parum elongato, antice nulli tuberculato; thorace non transverso, lateraliter sinuato, antice paulo attenuato, marginato, supra minute bicarinato et lateraliter diverse triluberculato, elytris thorace paulo latioribus, elongatis, apice alternatis, in singulis costis 7 munitis, intervallis fenestralis et multiplicatis, Long. 12 mill.

Tonkin : Cho Ganh (L. Duport).

Mophon diversipes n. sp.

Oblongus, nitidus, glaber, viridi-metallicus, elytris pro parte purpureis, minute lineato punctatis, intervallis latis, minute punctatis, infra corpore pro parte rufescente, antennis nigris, pedibus metallicis, tibiis apice et tarsis infra diverse luteo pubescentibus.

Oblong, brillant, glabre, vert métallique avec les intervalles en partie pourprés, coloration foncière un peu roussâtre par places; tête à ponctuation fine et écartée, plus forte sur le vertex, yeux

grands, transversaux, écartés; antennes noires, grêles, brillantes à la base, articles 5 et suivants allongés, opaques, fortement ponctués; prothorax court et large, à rebord complet, un peu en gouttière sur les côtés, à angles antérieurs nuls et postérieurs presque droits, finement et éparsement ponctué; écusson assez grand, subarqué au sommet, peu ponctué; élytres bien plus larges que le prothorax, sinués et convexes après la base en dessus, subsinués, atténués et subacuminés à l'apex, à rangées de points fins avec les intervalles larges et déprimés; pattes grêles, les antérieures plus courtes avec les tibias (sans doute caractère sexuel ♂) à peine arqués et frangés de poils jaunes à leur extrémité interne, les autres tibias plus longs et moins pileux. Long. 20 mill.

Paramba (de la collection Fairmaire au Muséum de Paris).

Diffère de *M. tinclipennis* Clap. (ex description) par la structure des antennes, la sculpture des élytres et la coloration.

Silidius unicolor n. sp. ♀.

Elongatus, sub-parallelus, concolor, testaceus, oculis solum nigris; thorace breve et lato, medio late depresso, marginato, lateraliter postice distincte plicato.

Allongé, subparallèle, concolore, testacé sauf les yeux noirs; tête large, moins que le prothorax cependant, peu et finement ponctuée; antennes grêles et assez longues, à 2^e article court, les autres longs; prothorax court et large, subarqué en avant, marginé, la marge, sur les côtés postérieurs, formant un pli surélevé brillant; élytres à peine plus larges que le prothorax, parallèles, finement et ruguleusement ponctués; pattes peu robustes, tibias diversement mais faiblement arqués. Long. 6 mill.

Madagascar (Perrier de la Bathie, in Muséum de Paris). Voisin de *S. nigriceps* Pic, en diffère par la tête non foncée, le prothorax plus large, dépourvu d'une saillie anguleuse latérale.

Xamerpus oxylepisiformis n. sp.

Subovalus, hirsutus, niger, membris testaceis, capite thoraceque fere opacis, elytris nitidis, fortiter punctatis, lateraliter compressis.

Subovalaire, noir, hérissé de poils en partie clairs, en partie obscurs, avant-corps presque mat et élytres brillants; tête à ponctuation fine et espacée; prothorax court et large, bombé sur le milieu, à ponctuation pupilleuse rapprochée; élytres courts et larges, convexes, très comprimés sur les côtés, infléchis et atténués à l'extrémité, à ponctuation très forte, rapprochée, irrégulière, calus huméral net. Long. 2,5-3 mill.

Madagascar (Perrier de la Bathie, in Muséum de Paris). Aussi dans la collection Pic.

Espèce caractérisée entre toutes par sa forme courte et trapue, ses élytres fortement comprimées sur les côtés ce qui lui donne un peu l'aspect de certains *Oscylepis* Desbr. A placer près de *X. Altuaudi* Pic.

Xamerpus subfasciatus n. sp.

Oblongus, subovalus, nitidus, hirsutus, niger, elytris vage griseo bifasciatis, antennis pedibusque pro parte testaceis.

Oblong-subovale, hérissé de poils en majeure partie clairs, noir brillant avec les antennes et les pattes en partie testacées; tête alutacée, à ponctuation fine, un peu écartée; prothorax court et large, bombé sur le milieu, à ponctuation irrégulière, peu forte, entremêlée de parties lisses; élytres assez courts et larges, convexes, comprimés sur les côtés, un peu infléchis et atténués à l'extrémité, à ponctuation forte, assez rapprochée, calus huméral saillant, ornés, avant et après le milieu, d'une fascie sinuée peu distincte faite de poils blancs espacés. Long. 3 mill.

Madagascar (ex coll. Fairmaire au Muséum de Paris).

Très distinct du précédent par sa forme moins raccourcie, la compression moins prononcée des élytres, leur ponctuation moins profonde et ces organes apparaissant fasciés.

Coenobius Schimperi n. sp.

Oblongus, parum latus, nitidus, niger, capite, thorace pedibusque testaceis; antennis, testaceis, apice piceis; oculis fere junctis; elytris substriato-punctatis.

Oblong, assez large, brillant, noir avec l'avant-corps et les membres testacés, extrémité des antennes rembrunie; tête petite avec les yeux presque joints, antennes assez longues et un peu élargies à l'extrémité; prothorax assez court et large, rétréci en avant, subtriangulairement et courtement prolongé sur le milieu de la base avec une rangée transversale de gros points, à peine ponctué sur la surface; écusson allongé, bordé par un sillon; élytres assez larges et courts, atténués à l'extrémité, à stries faibles, sauf les latérales assez profondes, ponctué de points moyens; pygidium noir. Long. 2, 3 mill.

Abyssinie : Tigré (Schimper, in Muséum Paris).

Cette petite espèce se distingue, à première vue, par sa coloration en partie testacée, des *C. obscuripes* Pic et voisin.

Isnus signatus n. sp.

Oblongus, antice et postice attenuatus, nitidus, niger, elytris, late testaceo villatis, villis postice junctis, pedibus pro parte antennisque testaceis, his brevibus; oculis approximatis.

Oblong, rétréci aux deux extrémités, brillant, en majeure partie noir, élytres bicolores, antennes testacées. Tête petite, yeux assez rapprochés; antennes courtes, à derniers articles élargis; prothorax assez court et large, un peu rétréci en avant, distinctement et diversement ponctué, la ponctuation étant un peu écartée; écusson allongé; élytres bicolores, testacés, avec les côtés antérieurement foncés et une longue et large bande suturale noire, rétrécie en arrière, à ponctuation en partie disposée en rangées, en partie disposée sur les intervalles et 2 petites stries latérales; pygidium noir; pattes en partie foncées, en partie testacées. Long. à peine 2 mill.

Tigré (Schimper, in Muséum Paris).

A placer près de *I. niger* W. qui ne m'est pas connu en nature.